Répartition des diagnostics des participants au test

| | cas n ⁹ 4 | |
|---|----------------------|-------|
| | Effectif | % |
| Melanome acrolentigineux | | |
| Mélanome | | |
| Mélanome de type SSM sur naevus préexistant | 1 | 1,49 |
| Naevus de Spitz de type angiomatoïde | 1 | 1,49 |
| Mélanome à cellules ballonisantes | | |
| Lésion mélanocytaire bénigne | 1 | 1,49 |
| Naevus de type acral (MANIAC) | | |
| Mélanome à cellules ballonisantes sur naevus préexistant | | |
| Kératose séborrhéique avec lésions de type lentigo sénile | | |
| Naevus composite | 1 | 1,49 |
| Mélanome sur naevus congénital | | |
| Nodule de croissance dans un naevus congénital | 1 | 1,49 |
| Naevus atypique de type génital | | |
| Mélanome des muqueuses | | |
| Mélanome de type SSM régressif sur naevus préexistant | 6 | 8,96 |
| Deep Penetrating Naevus (DPN) | | |
| Naevus traumatisé | 53 | 79,10 |
| Mélanome de Dubreuilh | | |
| Naevus de Sutton | 2 | 2,99 |
| Mélanome de type SSM | 1 | 1,49 |